



Maxforce® QUANTUM



INSECTICIDA EN GEL

Descripción del producto

Cebo en forma de líquido viscoso indicado para el tratamiento específico de todo tipo de especies de hormigas.

Dotado de una extraordinaria capacidad de atracción, el producto se aplica mediante pistola aplicadora en los caminos que trazan las hormigas y directamente a los nidos cuando estos pueden localizarse.

Los resultados de la aplicación son visibles desde el primer día, con una disminución de la actividad y aumento de la mortalidad en los días siguientes.

Espectro de acción

HORMIGAS

- // *Lasius niger* (**hormiga negra de jardín**)
- // *Linepithema humile* (**hormiga argentina**)
- // *Monomorium pharaonis* (**hormiga faraón**)*
- // *Tapinoma melanocephalum* (**hormiga fantasma**)*

*Solo para uso interior



Hormiga negra



Hormiga argentina



Hormiga faraón

Peligro y prudencia



ATENCIÓN

INDICACIONES DE PELIGRO

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- P102 Manténgase fuera del alcance de los niños.
- P391 Recoger el vertido.
- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

Escenarios de utilización

Uso en edificios como:

- // Interior:
 - Edificios industriales / comerciales.
 - Áreas domésticas y privadas (p. ej. cocinas, habitaciones, despensas, sótanos).
 - Edificios públicos (p. ej. hospitales, residencias).
- // Exterior:
 - Terrazas, pavimentos, patios y entradas a cobertizos y garajes.

Nota: NO para uso en tierra, césped o parterres.

Datos

Registro: ES/MR(NA)-2018-18-00483.

Composición y formulación: Imidacloprid al 0,03%. Cebo insecticida listo para el uso (RB).

Presentación: Blister con 4 cartuchos de 30 g.

Periodo de estabilidad del producto: 3 años (36 meses).

Equipo de protección

Bayer recomienda el uso del siguiente equipo de protección personal para la aplicación de **Maxforce® Quantum**.



Protección manos: Guantes de protección cumpliendo con la directiva EN 374:

- Material: Caucho nitrilo.
- Tasa de permeabilidad: > 480 min.
- Espesor del guante: > 0,4 mm.
- Índice de protección: Clase 6EQUI.



Protección ojos: Gafas de protección conformes con la EN166, campos de uso =5 u homologación equivalente.



Protección piel y cuerpo: Mono estándar y ropa de protección de categoría 3 tipo 5.

Certificaciones

// Formulación exenta de aceite de palma.

Dosis y usos autorizados

Ámbito de utilización	Método de aplicación	Categoría de usuario	Plazo de reentrada	Descripción del uso	Dosis Maxforce® Quantum	Superficie aplicación	Frecuencia
Interior y Exterior	Localizada en forma de gota tras presionar la jeringa dosificadora	Personal Profesional Especializado	No se requiere	General	200 mg (1 gota de 1 cm de diámetro)	1 m ²	Repetir la aplicación si la infestación no está controlada
				Hileras de hormigas		1 metro lineal	
				Nidos de hormigas	2 g (10 gota de 1 cm de diámetro)	Directamente en la entrada del hormiguero	

Instrucciones de uso

MODO DE EMPLEO

- // El producto se dispensa con aplicador de gel adecuado.
- // Abrir el tubo y presionarlo para extraer pequeñas gotas de cebo de aproximadamente 1 cm de diámetro (200 mg) cada una. Colocar estas gotas a lo largo de los caminos de hormigas.
- // Informar al titular de la autorización si el tratamiento no es eficaz.
- // Aplicar el producto lejos de la luz directa del sol o de fuentes de calor (por ejemplo, no colocarlo debajo de radiadores)
- // Comprobar los puntos de colocación del cebo una vez a la semana.
- // Para el uso en exteriores, aplicar este producto biocida en grietas y hendiduras solamente o directamente en los nidos de hormigas.
- // Cerrar el tubo después de usarlo.

APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN

- // La aplicación es localizada en forma de gota tras presionar la jeringa dosificadora.
- // Maxforce Quantum se puede aplicar tanto en el interior como en el exterior, de acuerdo a la dosificación siguiente: 1 gota de 1 cm de diámetro/m², cerca de 200 mg por metro cuadrado de área a tratar o 1 gota por metro lineal en los caminos (hileras) de hormigas.
- // Para el tratamiento de los nidos, inyectar 2 g de producto directamente en la entrada del nido.

ADVERTENCIAS AL USUARIO

- // Las recomendaciones e información que facilitamos en son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.).
- // La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido del producto.
- // El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones.

Otras recomendaciones de uso

- // Impedir el acceso de niños y animales a los cebos.
- // Eliminar los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.
- // Peligroso para las abejas.
- // Si la infestación no está controlada puede ser necesario repetir la aplicación.
- // No contaminar arroyos, ríos o vías fluviales con el producto o su envase.
- // Conservar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- // Proteger de la escarcha.
- // Conservar alejado de la luz.
- // Si el cartucho solo se ha usado parcialmente, retirarlo del aplicador, cerrarlo con la tapa proporcionada y guardarlo conforme a las instrucciones.
- // Una vez completado el tratamiento, retirar el cartucho vacío y desecharlo de forma segura.



Bayer CropScience, S.L.

Parque Tecnológico,
C/ Charles R. Darwin, 13,
46980 Paterna (Valencia). Tel. 96 196 53 00
www.es.bayer.es

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.